

ÉTUDE D'UNE COLLECTION D'OISEAUX DU SUD DU HUNAN
(CHINE),

PAR M. K. Y. YEN.

Cette Collection d'Oiseaux, que le Professeur S.-S. Sin a fait collecter dans le sud du Hunan et qu'il m'a ensuite envoyée pour étude à Paris, compte 157 spécimens représentant 95 espèces et sous-espèces. Parmi celles-ci, une race d'*Alcippe cinereiceps* a été décrite par moi comme nouvelle sous le nom de *A. c. Berliozii* (*Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 2^e s., t. IV, 1932, p. 381). Outre ces 95 formes, le collecteur en a encore observé 19 autres qui ne sont pas représentées dans cette collection. Je les mentionnerai au cours de cet exposé, en y adjoignant les notes de l'observateur, M. Ho.

La région d'où provient cette collection est située dans le sud du Hunan, vers le 26^e degré de latitude nord et entre le 112^e-113^e de longitude est. Elle consiste en deux districts, l'un s'appelle Woo-kang et l'autre Chin-tung-chan. Notre collègue M. Ho y est resté huit mois, de janvier jusqu'en août; mais la plupart des spécimens que j'ai reçus sont datés des mois d'avril, de mai et de juin.

La faune avienne du Hunan est encore très mal connue. Sauf O.-Grant qui a signalé dans *The Ibis* 1900, pp. 573-606, une série d'Oiseaux collectés par le Capitaine Wingate dans cette province, dont le premier mâle adulte de *Merganser squamatus* Gould ait été connu, peu d'Ornithologistes en ont parlé. Ma collection, quoique assez peu nombreuse, montre nettement que l'avifaune du sud du Hunan se rapproche beaucoup de celle du Kwangtung, du Kwangsi et du Kwei-chow, c'est-à-dire est essentiellement orientale. Plus au nord, vers la frontière du Hupeh, on trouve très probablement un plus grand nombre de formes paléarctiques.

Cette étude, faite au Laboratoire d'Ornithologie du Muséum de Paris, — et je remercie une fois de plus M. le Professeur Bourdelle et M. Berlioz, ainsi que M. Delacour, pour leur aide précieuse — est la suite de celle déjà publiée sur les Oiseaux du Kwangtung (*Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 2^e s., t. IV, p. 243) et fait partie d'un projet d'ensemble, par lequel je me propose d'étudier l'avifaune des diverses provinces de la Chine.

I. — NON-PASSERES

1. *Podiceps ruficollis Poggei* (Reichw.). — « J'ai vu plusieurs fois ce petit Grèbe dans des lacs de la région que j'ai explorée. *Bulletin du Muséum*, 2^e s., t. V, n^o 2, 1933.

Ion l'observation des paysans, cet Oiseau est sans doute sédentaire et très commun » (Ho).

? 2. *Phalacrocorax carbo sinensis* (Shaw et Nod.). — « Très souvent, sur les lacs et sur les rivières, j'ai vu des pêcheurs pêcher à l'aide du Grand Cormoran qu'on appelle *Yu-yia*, c'est-à-dire : Corbeau de Poisson. » (Ho). Mais cet Oiseau existe-t-il aussi à l'état sauvage dans cette région ?

3. *Ardea cinerea rectirostris* Gould. — « Cet Oiseau se trouve toujours solitaire dans les rizières et dans les marécages à la recherche de sa nourriture, plus rarement au bord des rivières. Il est tellement craintif que, pas une fois, je n'ai réussi à en obtenir un spécimen. » (Ho.)

4. *Egretta intermedia intermedia* (Wagl.). — ♂ et ♀ ad., 22 avril, 7 mai; ♂ jeune, 5 avril 1930, Woo-kang. — « Assez commun. On le voit au bord des fleuves et il ne visite que rarement les rizières. La plus grande bande que j'aie vue était composée d'une vingtaine d'individus. » (Ho.)

5. *Egretta garzella garzella* (L.). — « Cette petite Aigrette se mélange toujours avec la précédente en formant des bandes assez considérables. Elle a presque les mêmes mœurs et visite les mêmes endroits que son congénère. » (Ho.)

6. *Ardeola bacchus* (Bp.). — 1 ♂ ad. (en plumage des noces), 15 avril 1930, Woo-kang. — « Ce Crabier est un des Ardeidés les plus communs en cette région. On le trouve presque partout, où il y a des rizières dans lesquelles il se cache toute la journée, en cherchant sa nourriture. On l'appelle *Wo-ho*, c'est-à-dire : Crabier de riz. Le soir, on le voit voler et se poser en petits groupes soit sur le sommet des arbres, soit dans les jungles de Bambous. » (Ho.)

7. *Nycticorax nycticorax nycticorax* (L.). — « Plusieurs fois, j'ai vu de loin quelques Hérons au vol qui devaient être des *Nycticorax*. » (Ho.)

8. *Butorides striatus connectens* Stresemann. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 15, 23 avril 1930, Woo-kang. — « Assez commun. Il a presque les mêmes mœurs que l'*Ardeola bacchus* et visite les mêmes endroits. » (Ho.)

9. *Tringa ochropus* L. — 1 ♂, 11 avril 1930, Woo-kang. — « Très commun, en cette saison, dans la région ». (Ho.)

10. *Tringa hypoleucos* L. — 1 ♂, 20 avril 1930, Woo-kang. — « Aussi commun que le précédent. » (Ho.)

11. *Capella stenura* (Bp.). — 1 ♀, 6 mai 1930, Woo-kang. — « Assez commun aussi à cette époque. » (Ho.)

12. *Scolopax ruslicola rusticola* L. — « Je n'ai vu voler qu'un seul Oiseau de cette espèce, mais je n'ai pas réussi à l'obtenir. » (Ho.)

Gruidés. — « On m'a affirmé qu'il se trouve parfois en cette région des Grues. Mais je ne les ai jamais rencontrées. Il est possible qu'il y existe le *Grus grus Lilfordi* Sharp et le *Grus nigricollis* Przewalski. » (Ho.)

13. *Amaurornis fusca erythrothorax* (T. et S.). — « J'ai vu plusieurs fois ce petit Râle dans les rizières, mais je n'en ai pas obtenu un seul spécimen. » (Ho.)

14. *Amaurornis phœnicura chinensis* (Bodd.). — 1 ♂, 1 ♀ ad., 12 avril, 3 mai 1930, Woo-kang. — « Oiseau sédentaire et assez commun. Il se tient très souvent dans les buissons près des marécages et ne vient que rarement dans les rizières. Pendant l'époque des amours, le matin et le soir, il fait entendre de loin sa voix sonore et monotone. On l'appelle *Pa-mien-chi*, c'est-à-dire : Poule à face blanche. » (Ho.)

15. *Gallicrex cinerea* (Gm.). — « Selon les paysans, le Râle à crête n'est pas rare en cette région. Mais pendant mon séjour je ne l'ai vu qu'une seule fois. » (Ho.)

16. *Gallinula chloropus indica* Blyth. — « J'ai vu deux ou trois fois cette Poule d'eau qui doit être assez commune dans cette région. » (Ho.)

17. *Fulica atra atra* L. — 1 ♀ ad., 15 avril 1930. Woo-kang. — « Assez rare. » (Ho.)

18. *Phasianus torquatus torquatus* Gm. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 22, 24 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et commun. On le trouve très souvent dans les collines herbeuses tout près des habitations. Il se vend quelquefois au marché et à un prix très bas. » (Ho.)

19. *Chrysolophus pictus* (L.). — 1 ♂ ad., 5 juin; 1 ♀ ad., 25 mai 1930, Chin-tung-chan. — « Sédentaire et assez commun. Il vit toujours en petites familles dans les bois des hautes montagnes et, contrairement à l'espèce précédente, ne visite jamais les petites collines herbeuses proches des habitations. On l'appelle *Chin-chi*, c'est-à-dire : Faisan doré. » (Ho.)

20. *Tragopan Temminckii Temminckii* (Gray). — 1 ♂ ad., Chin-tung-chan. — « Oiseau sédentaire et très rare, ne se trouve que dans les bois des hautes montagnes. On l'appelle *Ko-chi*, c'est-à-dire : Faisan à corne. » (Ho.) — Il est très intéressant de trouver en cette région cet Oiseau qui est assez rare partout. Dans le nord du Kwangtung, région contiguë à celle-ci, le naturaliste allemand, Dr Mell, a collecté une belle série d'une autre espèce, *Tragopan Caboli* (Gould), dont nous n'avons par contre aucun

spécimen du sud du Hunan. — La femelle du *T. T. tonkinensis* Delacour du Tonkin, diffère de celle de la forme typique par le ton général plus roux et les marques du dessus comme du dessous plus noires et plus grandes.

21. *Bambusicola thoracica thoracica* Temm. — 1 ♂ ad., 9 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et commun. Son nom indigène est *Chou-chi*, c'est-à-dire : Poule de bambous. » (Ho.)

22. *Coturnix coturnix japonica* T. et S. — « On m'a affirmé que, chaque année, en automne, cet Oiseau arrive en bandes considérables. On en capture un grand nombre d'individus vivants, destinés à la consommation. » (Ho.)

« Je suis bien étonné de n'avoir pas trouvé dans cette région ni le Faisan argenté (*Gennæus nycthemerus*), ni le Francolin (*Francolinus pintadeanus*), qui sont, par ailleurs, très communs dans le sud de la Chine. » (Ho.)

23. *Streptopelia orientalis orientalis* (Lath.). — 1 ♂ ad., 15 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et assez commun. Il vit toujours dans les bois des collines et ne visite que rarement le voisinage des habitations. » (Ho.)

24. *Streptopelia chinensis chinensis* (Scop.). — 1 ♂ ad., 12 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. On le trouve partout. En captivité, il devient très familier. » (Ho.)

25. *Ænopopelia tranquebarica humilis* (Temm.). — 1 ♂ ad., 6 mai 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et assez commun. Il vit toujours dans les bois de Pins au pied des petites collines et ne visite pas le voisinage des habitations. Son roucoulement est très différent et facile à distinguer de celui des autres Tourterelles. » (Ho.)

26. *Falco peregrinus* subsp. ? — « J'ai vu une fois un *Falco* probablement de cette espèce. Mais de loin, je n'ai pas pu le reconnaître exactement. » (Ho.)

27. *Falco subbuteo Streichi* Hart. et Neum. — 1 ♂ ad., 3 mai 1931 Woo-kang. — « On ne rencontre que rarement ce Faucon. Son vol est extrêmement rapide. » (Ho.)

28. *Falco tinnunculus* subsp. — « Vu deux ou trois fois. » (Ho.)

29. *Buteo burmanicus* Oates. — « Observé plusieurs fois. » (Ho.)

30. *Milvus linealus* (Gray). — 1 ♂ ad., 3 mai; 1 ♀ imm., 12 avril 1930, Woo-kang. — « Oiseau sédentaire et très commun. On le voit très souvent planer au dessus des rivières en quête de nourriture, sur laquelle il se précipite soudainement en l'attrapant avec ses pattes bien exercées. Il n'éprouve aucune crainte du voisinage immédiat des hommes, même armés d'un fusil. » (Ho.)

31. *Accipiter nisus nisosimilis* (Tick.). — 1 ♀ imm., 24 avril 1930, Woo-kang. — « Assez commun. Très souvent il chasse de petits oiseaux sur les collines peu boisées et aux environs des habitations. » (Ho.)

32. *Accipiter gularis gularis* (T. et S.). — 1 ♀ ad., 24 avril 1930, Woo-kang.

33. *Circus melanoleucus* Forst. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 11, 12 avril 1930, Woo-kang. — « Assez commun, comme le précédent. » (Ho.)

? 34. *Circus cyaneus cyaneus* (Linn.). — « Un paysan m'a raconté qu'il avait tué plusieurs fois le Busard gris. Il est possible que ce Busard gris soit *C. cyaneus*. » (Ho.)

35. *Glaucidium cuculus Whiteleyi* (Blyth.). — 1 ♂ ad., 2 mai 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et commun. » (Ho.)

36. *Ninox scutulata scutulata* (Raffles). — 1 ♂ ad., 6 mai 1930, Woo-kang. — D'après la date de capture, il se pourrait que cet Oiseau, d'ailleurs assez commun, niche dans cette région.

37. *Cuculus canorus* subsp. ? — « Vers la fin du mois de mai, j'ai reconnu la voix du Coucou commun, *Cuculus canorus*, qui arrive, paraît-il, un peu plus tard que le *C. micropterus*. » (Ho.)

38. *Cuculus micropterus micropterus* Gould. — 1 ♂ ad., 23 avril 1930, Woo-kang. — « Très commun à cette époque. » (Ho.)

39. *Picus canus Ricketti* Baker. — 1 ♀, 19 avril 1930, Woo-kang. — Cet exemplaire étant assez médiocre, il est difficile de l'attribuer exactement à l'une des deux sous-espèces *Guerini* ou *Ricketti*. A cause de sa teinte générale assez foncée et légèrement bronzée, je l'attribue plutôt à *Ricketti*. — « Sédentaire et commun, non seulement dans les bois des montagnes, mais aussi dans les jardins des villes. » (Ho.)

40. *Dryobates Cabanisi (mandarinus ?)*. — « Observé le 19 avril 1930, à Woo-kang. » (Ho.)

41. *Blythipicus pyrrhotis sinensis* (Richett.). — 1 ♂ ad., 1^{er} juin 1930, Chin-tung-chan. — « Sédentaire et commun. Il passe sa vie entière dans les forêts des montagnes et ne visite jamais les jardins des villes, contrairement au Pic vert. » (Ho.)

42. *Caprimulgus indicus jotaka* T. et S. — La femelle, particulièrement développée, a une teinte générale plus grise et une aile plus longue que le mâle (210 mm. contre 205 mm.). — « Oiseau sédentaire et assez commun. Au crépuscule, il sort de la forêt et vole parmi les endroits découverts à la chasse des petits insectes. » (Ho.)

43. *Alcedo althis bengalensis* Gm. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 12, 14 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. On le trouve presque partout pourvu qu'il y ait de l'eau, où il puisse obtenir sa subsistance. » (Ho.)

44. *Halcyon pileata* (Bodd.). — 1 ♂ jeune, 18 avril; 1 ♀ ad., 25 avril 1930, Woo-kang. — Le jeune mâle a son collier roux et les plumes de la poitrine bordées de noir. Son bec et ses pattes sont également d'un rouge moins foncé et plus orangé que l'adulte. — « Très commun. Dans son estomac, on trouve plus souvent des restes d'insectes que de poissons. » (Ho.)

45. *Ceryle rudis leucometanura* Reichenb. — « Près des cours d'eau et des lacs, le Martin-pêcheur pie n'est pas rare. Je l'ai vu à plusieurs reprises, mais, à cause de la grande distance, sans réussir à l'attraper. » (Ho.)

46. *Ceryle lugubris guttulata* Stejneger. — « Je n'ai vu qu'une seule fois ce grand Martin-pêcheur. » (Ho.)

II. — PASSERES

47. *Hirundo rustica gutturalis* Scop. — « Au mois de juin, l'Hirondelle de cheminée est très nombreuse au Hunan. » (Ho.)

48. *Hirundo daurica nepalensis* Hodgson. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 6 juin 1930, Chin-tung-chan. — « Assez commun. Au vol, cette Hirondelle se mélange toujours aux bandes de *H. r. gutturalis*. » (Ho.)

49. *Siphia mugimaki* (Temm.). — 1 ♂ ad., 15 avril 1930, Woo-kang. — « Cette espèce est assez rare à Woo-kang. » (Ho.)

50. *Muscicapula narcissina xanthopygia* (Hay.). — 1 ♂, 1 ♀ ad., 15 avril 1930, Woo-kang. — « Pendant la période des passages, ce Gobe-mouches n'est pas rare à Woo-kang. » (Ho.)

51. *Tchitrea paradisi Incei* (Gould.). — 1 ♂, 1 ♀ ad., (phase rousse), 25 avril, 7 mai 1930, Woo-kang. — « Assez commun. Je n'ai jamais trouvé un seul individu au plumage blanc. » (Ho.)

52. *Rhodophila ferrea Haringtoni* (Hartert). — 1 ♂ ad., 5 juin 1930, Chin-tung-chan. — « Très commun. Se trouve plus souvent dans les champs cultivés que dans les forêts de montagnes. » (Ho.)

53. *Enicurus Leschenaulti sinensis* Gould. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 9, 12 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. Sa vie est essentiellement aquatique et je ne l'ai jamais vu quitter le bord des cours d'eau. » (Ho.)

54. *Brachypteryx sinensis* Rickett. — 1 ♂ ad., 24 mai 1930, Chin-tung-chan. — Cette espèce est très rare partout et son aire de distribution reste encore insuffisamment connue. Rickett, en mai 1897,

l'a découverte à Kuatun, dans le nord-ouest du Fohkien. Plus tard, on l'a retrouvée dans l'Assam et dans le nord des Monts Cachar. Elle se trouve également à Yaoschan dans le Kwangsi, d'où j'en ai obtenu une série. Mais, chose curieuse, dans le Kwangtung, province entourée par le Fohkien, par le Hunan et par le Kwangsi, on n'a jamais signalé cet Oiseau, pas plus que dans le Kwei-chow, dans le Yunnan et en Indochine. — « Très rare. C'est le seul individu que j'aie vu pendant les deux mois de mon séjour à Chin-tung-chan. Je ne l'ai jamais rencontré à Woo-kang. » (Ho.)

55. *Brachypteryx leucophrys Carolinæ* La Touche. — 1 ♂ ad., 19 mai 1930, Chin-tung-chan. — « Très rare également. Cet exemplaire, comme celui de *B. sinensis*, a été obtenu à terre dans la forêt, parmi un amoncellement de feuilles mortes. » (Ho.)

56. *Copsychus saularis saularis* (Linn.). — 1 ♂, 1 ♀ ad., 12, 19 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. On le garde précieusement comme Oiseau de chant et de combat. Il s'adapte très bien à la captivité. » (Ho.)

57. *Turdus merula mandarinus* Bp. — 1 ♂, 1 ♀ ad., 9, 12 avril 1930, Woo-kang. — « Sédentaire et très commun. » (Ho.)

58. *Turdus cardis lateus* Thayer et Bangs. — 2 ♂ ad., 24, 27 avril 1930; 1 ♀ ad., 12 avril 1930, Woo-kang. — Le mâle adulte de cette forme diffère de celui de *T. c. cardis* Temm. par sa tête et son cou qui sont d'un noir nettement séparé du gris ardoisé du dos; les sous-alaires, au lieu de devenir ardoisé, restent rousses. — « Assez commun. On le voit toujours à terre dans les bois où il y a des feuilles mortes, parmi lesquelles il cherche sa nourriture. » (Ho.)

59. *Turdus eunomus* Temm. — 1 ♂ ad., 20 avril 1930, Woo-kang. — « On ne rencontre que rarement cet Oiseau. Il se tient, comme beaucoup de *Turdus*, dans les sous-bois à la recherche de sa nourriture. » (Ho.)

60. *Phylloscopus reguloides disturbans* (La Touche). — 1 ♂ ad., 19 mai 1930, Chin-tung-chan. — Cet exemplaire, par le dessus du corps d'un vert clair, la deuxième rémige de longueur intermédiaire à la neuvième et à la sixième, et le liseré interne des rectrices assez étroit, correspond très bien au *disturbans* du Yunnan. — « Vit en bandes avec d'autres petits oiseaux et n'est pas rare à cette époque. » (Ho.)

61. *Seicercus Burkii* (*Latouchei* Bangs. ?) — 1 ♂ ad., 17 mai 1930, Chin-tung-chan. — En l'absence de spécimens assez nombreux pour étudier comparativement les nombreuses formes de cette espèce, la détermination de cet exemplaire reste incertaine. — « Assez rare à Chin-tung-chan et jamais vu à Woo-kang. » (Ho.)

{A suivre}.